



PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE RITUXIMAB EN PACIENTES ADULTOS

ANTECEDENTES DE PACIENTE

NOMBRE DE PACIENTE	
EDAD	
N° DE FICHA	
PESO / TALLA	/
DIAGNÓSTICO	
DOSIFICACIÓN	

ADMINISTRACIÓN DE PREMEDICACIÓN

- Previo a infundir Rituximab administrar premedicación para reducir riesgo de reacciones adversas.

MEDICAMENTOS	TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN
Paracetamol 500 mg VO	30 minutos previos a infusión de Rituximab
Clorfenamina 10 mg EV	30 minutos previos a infusión de Rituximab
Betametasona 4 mg EV	30 minutos previos a infusión de Rituximab

ADMINISTRACIÓN DE RITUXIMAB

- Monitorización de signos vitales durante la primera hora cada 30 minutos y posteriormente cada hora.
- Comience la infusión a una velocidad de 50 mg/hora.
- Si pasados 30 minutos no se produce ninguna reacción, incremente la velocidad a 100 mg/hora.
- Si no tiene lugar ninguna reacción a la infusión, continúe aumentando la velocidad 50 mg/hora, cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/hora.
- Terminada la infusión, controlar signos vitales del paciente luego de 1 hora.

INTERVALO DE TIEMPO	DOSIS	VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN (volumen en ml /hora)	PA	FC	FR	T°
0 a 30 minutos	50 mg/h					
30 minutos a 1 hora	100 mg/h					
1 hora a 1 hora 30 minutos	150 mg/h					
1 hora 30 minutos a 2 horas	200 mg/h					
2 horas a 2 horas 30 minutos	250 mg/h					
2 horas 30 minutos a 3 horas	300 mg/h					
3 horas a 3 horas 30 minutos	350 mg/h					
3 horas 30 minutos a 4 horas	400 mg/h					



REACCIONES ADVERSAS RELACIONADAS A ADMINISTRACIÓN DE RITUXIMAB

- Si se produce una reacción de hipersensibilidad o relacionada a la infusión leve a moderada: reducir la velocidad de administración o detener la infusión.
- Si la reacción se desvanece, reiniciar la infusión a los 30 minutos en un 50% de la tasa anterior.
- En caso de presentar reacciones graves, suspender medicación, tratar al paciente y mantener hospitalizado para observación.

Reacción leve	Hiperemia, palpitaciones, temblores, cefalea o náuseas.
Reacción moderada	Hipotensión o hipertensión, dolor en zona torácica, fiebre, urticaria.
Reacción grave	Hipotensión o hipertensión, dolor en zona torácica, disnea, broncoespasmo, estridor, shock.

OBSERVACIONES DURANTE INFUSIÓN	
---------------------------------------	--